

Diarre og afføringsprøver

En ofte overset årsag til diarre er snylte amøben *Giardia*, som let afsløres ved en afføringsprøve.

Da ormekur er et receptpligtig middel og mange dyrlæge ikke udskriver ormekur uden påvist orm i afføringen, er det en god indfaldsvinkel, hvis der pludselig opstår diarre hos din kat.

Giardia amøben er nemlig drilsk, da antibiotika ikke har nogen effekt på den. Kommer du til dyrlæge med en kat med diarre er dyrlægens første behandlingsvalg oftest og ganske korrekt antibiotika, da diarreen ofte skyldes en infektion.

Er det amøben kan en ormekur klare problemet. Det er dog vigtigt at bemærke, at behandlingstiden er anderledes og at behandlingen bør foretages i samråd med dyrlægen, når diagnosen *Giardia* er stillet.

Skulle din kat få diarre, er det en god ide at få undersøgt en afføringsprøve som standard.

Dyrlæge Hanne Hallsson skriver følgende om denne tarm infektion i bogen "Hunden, Katten og Dig":

Giardiasis tarminfektion

forårsaget af det encellede snyltedyrl (flagellaten) Giardia

Giardiasis forekommer i tarm kanalen hos mennesker og adskillige andre dyr, hvor de virker forstyrrende på tarmkanalens optagelse og nedbrydning af føden ved at lægge sig som "sugekopper" hen over tarmtrevlerne. Dette medfører diarre, evt. fedtdiarre (dvs. lys, gullig, fedtet afføring).

Giardia overføres i form af cyster (dvs. hvilestadier), der udskilles med afføringen. Cysterne kan holde sig længe i miljøet, men er følsomme overfor skoldning, de fleste detergenter (dvs. overfladeaktive vaskemidler) samt blegemidler (klorholdige forbindelser, blege-essens). Desuden tåler de ikke udtørring.

Problemet opstår oftest i kenneler/katterier og andre steder, hvor der er mange dyr på et lille areal og hygiejniske problemer.

Diagnosen stilles ved at dyrlægen finder cysterne ved mikroskopi af afføringsprøver.

Behandling: Almindelig ormemedler som *mebendazol* (Vermox) samt *fenbendazol* (Panacur) har en effekt overfor *Giardia* flagellater.

